



Situația mamei și a copilului în mediul rural

Situația mamei

Fe

42.5% dintre gravide prezintă anemie feriprivă,
situată cea mai gravă înregistrându-se în mediul rural

B₉

Numai **30%** dintre gravide au luat acid folic în perioada sarcinii



Consultația prenatală

32% dintre gravide s-au prezentat doar în al treilea trimestru de sarcină la prima consultație prenatală

6% nu au fost examineate de nici un medic în timpul sarcinii



Utilizarea redusă a serviciilor prenatale și atenția scăzută acordată de personalul medical aspectelor nutriționale au **consecințe negative** asupra sănătății gravidei și nou-născutului, printre care **deficitul de iod, anemia feriprivă** și **greutatea mică** la naștere.

Populația care are nevoie de **îndrumare** și **sprijin**, populația cu nivel redus de școlarizare și cea din mediul **rural**, beneficiază în proporția cea mai mică de aceste servicii.





Situația mamei



90% dintre copii părăsesc maternitatea alăptați

peste **40%** dintre copii sunt înțărcați la 3 luni

16% dintre sugari sunt alăptați exclusiv la sân până la 6 luni (2011)


Piedici



Structura maternităților, cu doar **41%** rooming-in,
împiedică dezvoltarea unei relații fire și între mamă și copil
și se constituie într-un obstacol serios în ceea ce privește
alăptarea exclusivă și la cerere.

Femeile din mediul rural și cele cu un **nivel de școlarizare redus**
sunt cele care primesc cele mai puține informații despre alaptare.

Chiar și atunci când în maternitate se face promovarea alăptării,
ea **nu este susținută** de servicii de sprijin în teren.



Consecințe



Greutatea mică la naștere

la copiii din rural (minimum **8%**)

la cei născuți de mame cu nivel scăzut de educație (aproximativ **12%**)

la copiii de rang 4 și peste (**11%**, chiar **18%** în unii ani)

Greutatea mică față de talie a copiilor sub **5 ani** (indicator de malnutriție)

Prevalența greutății mici pentru talie la nivel național în 2010 a fost de **10.4%**
ceea ce ridică problema unei deficiențe nutriționale importante)

60% din cazurile noi de malnutriție protein-calorică

la copilul de **0-3 ani** s-au înregistrat în mediul rural




Consecințe



Probleme de **anemie și răhitism**

48% la copiii între 6-12 luni;
43,6% la copiii de 12 luni;
40,5% la copiii de 24 de luni;



La copilul școlar, **anemia feriprivă** înregistrează, de asemenea, o prevalență mare, respectiv de **23.4%**
25% dintre copiii anemici de rang ≥ 4 au anemie gravă

La 1-2 ani prevalența anemiei copiilor de rang 4 sau mai mare a fost de peste **60%**

7.7% din copiii până în 24 de luni nu au primit niciodată profilaxie cu vitamina D pentru răhitism
10.9% din copiii din mediul **rural** nu au primit vitamina D până la 2 ani față de **4.9%** în **urban**



Situată copilului



Copiii devin victimele unui cerc vicios „**Ciclul Infecție-Subnutriție**” care constă în:

