

## TEST-GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTIȚELOR

1-Agentul etiologic incriminat în 2/3 din cazurile de endocardită bacteriană subacută (lentă) este:

- A - streptococul viridans
- B - stafilococul alb
- C - stafilococul auriu

2-O intervenție specifică asistentului medical în cadrul planului de îngrijire pentru pacientul cu esofagită de reflux, cu risc de aspirare a secrețiilor gastrice, este:

- A - reducerea până la dispariție a durerii
- B - menținerea liberă a căilor respiratorii
- C - poziționarea pacientului în ortostatism după mesele principale

3-Escara de gradul III poate evolua:

- A - nefavorabil în toate cazurile
- B - spre vindecare cu sechele cicatriciale în condiții de tratament corespunzător sau se transformă în escară de gradul IV
- C - vindecare fără cicatrice

4-Durata fazei de contracții clonice a crizei de grand mal, la copil, este de:

- A - 1-2 minute
- B - 5-15 minute
- C - 30-60 secunde

5-Reacția alergică de hipersensibilitate imediată cu manifestări intense este:

- A - șocul hemoragic
- B - șocul neonatal
- C - șocul anafilactic

6-Greutatea normală la naștere a nou născutului este:

- A - 2000- 2800 grame
- B - 3000- 3200 grame
- C - 4000- 4200 grame

7-În cazul tratamentului hipertensiunii arteriale, cantitatea de sare indicată în regimul desodat relativ este:

- A - 1-1,5 g sare/zi
- B - 2-5 g sare/zi
- C - 0,5 g sare/zi

**8-Efectele hormonilor ovarieni constau în:**

- A - scăderea vascularizației tegumentelor
- B - stimularea creșterii foliculilor ovarieni
- C - inhibarea creșterii osoase

**9-Anamneza unui pacient cu manifestări specifice unei afecțiuni digestive, cuprinde și date despre:**

- A - comportamente (fumat, consum de alcool)
- B - somn
- C - igiena personală

**10-La nou născut, fontanela anterioară are o formă de:**

- A - romb
- B - triunghi
- C - pătrat

**11-Una dintre complicațiile tardive ale astmului bronșic este:**

- A - emfizem pulmonar
- B - sincopă de tuse
- C - pneumotorax spontan

**12-Infecțiile urinare „înalte” afectează:**

- A - întregul tract urinar
- B - căile urinare extrarenale
- C - rinichii

**13-Sunt manifestări de dependență apărute la pacientul cu problema de îngrijire „Insomnia”, cu excepția:**

- A - dizartria, dislalia, confuzia, halucinațiile
- B - dificultatea de a adormi și de a rămâne adormit
- C - durerea, polakiuria nocturnă, tusea iritativă, dispneea

**14-Una dintre cardiopatiile congenitale cianogene este:**

- A - stenoza aortică
- B - situs inversus
- C - transpoziția de mari vase

**15-Afecțiunea glomerulară bilaterală caracterizată prin edeme voluminoase și proteinurie masivă (peste 3 gr/24 h) se numește:**

- A - glomerulonefrită difuză acută
- B - pielonefrită
- C - sindrom nefrotic

**16-Tulburările ritmului cardiac în conducerea stimulilor se numesc:**

- A - tahicardii
- B - extrasistole
- C - blocuri

**17-Timpul esofagian al deglutiției:**

- A - este important pentru că asigură trecerea bolului alimentar prin segmentul digestiv
- B - cuprinde trecerea bolului alimentar din gură în faringe
- C - constă în împingerea bolului alimentar de-a lungul esofagului prin contracția musculaturii circulare

**18-Ulcerul gastro - duodenal este:**

- A - leziune
- B - stenoză
- C - disfagie dureroasă

**19-Profesia de asistent medical generalist, moașă și respectiv de asistent medical se exercită pe teritoriul României:**

- A - numai în regim salarial
- B - în regim independent
- C - în regim salarial și/sau independent

**20-Starea patologică caracterizată prin inflamația peretelui bronșic, limitată la mucoasă și corion, cu tulburări ale secreției, permeabilității și sensibilității peretelui bronșic, poartă numele de:**

- A - cancer bronho-pulmonar
- B - tuberculoză
- C - bronșită acută

**21-În glomerulonefrita difuză acută la copil, tensiunea arterială este:**

- A - normală
- B - scăzută
- C - crescută

**22-Capacitatea gastrică redusă a prematurului impune mese în cantități mici și repetate, putând astfel să ajungă la:**

- A - 10 mese în 24 h
- B - 7 mese în 24 h
- C - 5 mese în 24 h

**23-Circulația capilară conține sânge circulant, aproximativ:**

- A - 5 %
- B - 10 %
- C - 15 %

**24-Cauza cea mai frecventă a bronșiectaziilor o reprezintă:**

- A - ganglionii măriți
- B - infecțiile bronșice repetate
- C - tumorile bronșice

**25-**În combinarea compresiunilor toracice cu ventilația din cadrul suportului vital de bază este recomandat:

- A - 30 compresiuni la 2 ventilații
- B - 60 compresiuni la 2 ventilații
- C - 30 compresiuni la 1 ventilație

**26-**Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:

- A - certificatul de membru
- B - avizul anual
- C - documente de studii care atestă formarea în profesie

**27-**Expresia anatomo - clinică a sindromului clinic de autodigestie pancreatică o reprezintă:

- A - pancreatită cronică
- B - pancreatită acută
- C - hepatită cronică

**28-**În glomerulonefrita acută cu hipertermie, asistentul medical va administra la indicația medicului:

- A - Vitamina B
- B - Ampicilină 500g/6 ore
- C - Vitamina C

**29-**Pronația:

- A - este mișcarea prin care mâna, antebrațul respectiv, se rotesc în așa fel încât degetul mare să se apropie de planul sagital median
- B - reprezintă mișcarea prin care segmentele revin în poziția inițială anatomică
- C - denumește activitatea prin care persoana aleargă, se ghemuiește sau îngenunchează

**30-**Contractiile premature, anticipate, care tulbură succesiunea regulată a contracțiilor inimii, se numesc:

- A - tahicardii paroxistice
- B - fibrilații atriale
- C - extrasistole

**31-**Hipotermia ușoară este diagnosticată atunci când temperatura centrală este:

- A - cuprinsă între 30-32 grade Celsius
- B - mai mică de 30 grade Celsius
- C - cuprinsă între 32-35 grade Celsius

**32-**Endocardita bacteriană poate fi:

- A - malignă
- B - trombozantă simplă
- C - reumatismală

**33-**Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică:

- A - pe o perioadă de 6 luni
- B - până la realizarea numărului minim de credite
- C - pe o perioadă de 12 luni

**34-**Simptomul cheie în insuficiență renală acută este:

- A - oligoanuria
- B - edemul
- C - retenția de produși azotați

**35-**Acumularea de puroi la nivelul cavității pleurale se numește:

- A - pneumonie necrozantă
- B - pneumotorax
- C - empiem pleural

**36-**În hemiplegia flască pacientul prezintă:

- A - paralizie facială, membre inferioare și superioare hemiplegice, hipertonie
- B - forță musculară abolită, exagerarea reflexelor ostetendinoase, semn Babinski absent
- C - paralizie facială, membre inferioare și superioare hemiplegice, forță musculară abolită, hipotonie, abolirea reflexelor ostetendinoase, semn Babinski prezent

**37-**În hiperkaliemia severă, scopul tratamentului este:

- A - creșterea eliminărilor de potasiu
- B - inducerea migrării de potasiu în spațiul intracelular
- C - antagonizarea efectelor toxice ale potasiului

**38-**Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt:

- A - competența, corectitudinea și comunicarea
- B - profesionalismul, cooperarea și empatia
- C - experiența profesională, responsabilitatea și cinstea

**39-**Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:

- A - în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală
- B - pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului
- C - când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență

**40-**Riscul de aspirare a secrețiilor gastrice pe calea respiratorie este posibil în cazul pacientului cu:

- A - colecistită cronică
- B - ulcer gastro-duodenal
- C - esofagită de reflux

**41-**Tabloul clinic din acidoza metabolică cuprinde:

- A - contracții musculare dureroase
- B - respirație Kussmaul, halenă de acetonă, somnolență
- C - respirație superficială

**42-**În gastroenterita acută toxică cu sindrom de deshidratare apărută la un sugar, tratamentul necesită:

- A - primele 10-24 h dietă de tranziție cu mucilagiu de orez
- B - primele 24-48 h perfuzie endovenosă de rehidratare
- C - dietă hidrică 6-12 h cu săruri de rehidratare orală

**43-**Sângerarea ciclică ce durează mai mult de 7 zile cu flux sanguin crescut este:

- A - polimenoree
- B - menometroragie
- C - hipermenoree

**44-**Sunt surse de dificultate psihologice ale dispneei:

- A - anxietatea, atacul de panică, situația de criză
- B - anxietatea, poluarea, umezeala
- C - poluarea, umezeala, situația de criză

**45-**Edemele de tip renal sunt:

- A - moi, pufoase, albe, localizate facial și la nivelul membrelor inferioare
- B - declive, cu colorație roșiatică și cu tulburări trofice
- C - declive, cu hepatomegalie, ascită și probe hepatice pozitive

**46-**Incubația în varicelă este de regulă:

- A - 2- 3 zile
- B - 10 zile
- C - 14- 15 zile

**47-**Intervențiile asistentului medical pentru pacientul cu afecțiuni neurologice includ:

- A - asigurarea îngrijirilor în funcție de afectarea senzorio-motorie a bolnavului
- B - să vorbească șoptit ca să nu deranjeze pacientul
- C - să nu comunice cu pacientul dacă acesta este somnolent

**48-**Debutul tardiv sau inițierea dificilă a micțiunii în adenomul de prostată este un simptom:

- A - obstructiv
- B - iritativ
- C - de umplere

**49-**Una din cauzele insuficienței renale acute de origine prerenală este:

- A - litiaza renală
- B - starea de șoc prin scăderea debitului sanguin
- C - glomerulonefrita difuză acută complicată

**50-**Constituie încălcare a regulilor etice:

- A - aprecierile în public sau pe rețelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în scopul de a induce în eroare opinia publică
- B - nerespectarea programului de lucru
- C - înscrierea într-o organizație sindicală

**51-**Dintre obiectivele îngrijirii pacientului cu tromboembolism pulmonar face parte:

- A - prevenirea hipotensiunii arteriale cronice
- B - aplicarea tratamentului cu heparină
- C - prevenirea hipertensiunii pulmonare cronice tromboembolice

**52-**Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2008, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor:

- A - altor acte normative
- B - Codului administrativ
- C - Codului penal

**53-**Valorile normale ale tensiunii arteriale sistolice sunt:

- A - 110-140 mmHg
- B - peste 140 mmHg
- C - sub 110 mmHg

**54-**Dintre bolile acute ale căilor respiratorii superioare, cele care impun internare obligatorie pentru îngrijire și tratament în spital (la sugar sau copilul mic) sunt:

- A - rinitele
- B - laringitele
- C - rinofaringitele

**55-**Sângele din ventriculul stâng este pompat în:

- A - artera aortă
- B - artera pulmonară
- C - arterele coronare

**56-**Care este autoritatea ce recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:

- A - Ministerul Sănătății
- B - Ministerul Muncii
- C - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

**57-**Lipsa de cunoștințe ca etiologie a problemei de dependență „Comunicare ineficace la nivel senzorio-motor” este reprezentată de:

- A - prevenirea, atenuarea sau eliminarea unor surse de dificultate
- B - diferențele culturale, ignoranța
- C - mecanismele de apărare psihologică și adaptarea la situația actuală

**58-**Obiectivul pacientului cu problema de dependență „Nutriție dezechilibrată prin deficit” poate fi:

A - să demonstreze revenirea la echilibrul nutrițional corespunzător nevoilor organismului în decurs de...zile

B - să reducă aportul cotidian de alimente la.....porții în decurs de....zile

C - să evite gustările între mese, să mestece bine și lent, să renunțe la mâncare ca mijloc de compensare a altor nevoi

**59-**Meteorismul este explicat ca:

A - distensia vezicală deasupra simfizei pubiene

B - durerea cauzată de mișcările peristaltice exagerate

C - modificarea de volum a abdomenului din cauza gazelor conținute în intestine

**60-**Nașterea normală mai este numită:

A - cezariană

B - eutocică

C - distocică

**61-**Posterior, vaginul vine în raport cu:

A - uretra

B - rectul

C - vezica urinară

**62-**Debutul glomerulonefritei acute este brusc, copilul prezentând dimineața, când se scoală:

A - febră, frisoane

B - poliurie

C - edeme, în special palpebrale

**63-**Obstrucția totală sau parțială a unei vene prin coagulare intravasculară, cu inflamația peretelui venos, se numește:

A - cianoză

B - edem

C - tromboflebită

**64-**Îngrijirea pacienților în șoc hipovolemic se concentrează pe:

A - asistarea tratamentului care vizează cauza șocului exclusiv

B - asistarea tratamentului care vizează cauza șocului și refacerea volumului intravascular

C - refacerea volumului intravascular exclusiv

**65-**Saturația normală a oxigenului din sânge, monitorizată cu pulsoximetru are valoarea cuprinsă între:

A - 90-95 %

B - 85-90 %

C - 98-100 %

**66-**Ce valoare are diametrul indurației în urma injecției intradermice cu tuberculină, pentru un diagnostic pozitiv de infecție tuberculoasă prezentă:

A - mai mic de 10 mm

B - mai mare sau egal cu 10 mm

C - 5 mm



**67-**Încurbarea coloanei vertebrale cu convexitatea înainte, se numește:

- A - lordoză
- B - scolioză
- C - cifoză

**68-**Cauza principală a pericarditei cronice constrictive este:

- A - pericardita acută benignă
- B - pericardita purulentă
- C - tuberculoza

**69-**Malformația congenitală în care inima, ficatul și splina sunt așezate în partea opusă celei normale, se numește:

- A - situs inversus
- B - coarctăție de aortă
- C - dextrocardie

**70-**Primul pas în realizarea unui plan de îngrijire este:

- A - stabilirea priorităților
- B - obținerea informațiilor relevante despre pacient
- C - stabilirea obiectivelor pe termen mediu

**71-**Legătura între făt și placentă, acoperit de amnios, cu aspect lucios și spiralat, poartă numele de:

- A - corion
- B - placentă
- C - cordon ombilical

**72-**Vascularizația nutritivă a plămânului face parte din:

- A - mica circulație
- B - marea circulație
- C - circulația limfatică

**73-**Fenomenul numit „deficit al pulsului” este întâlnit în:

- A - tahicardia paroxistică
- B - flutterul atrial
- C - fibrilația atrială

**74-**Una dintre manifestările de dependență din sindromul nefrotic este:

- A - hemoptizie
- B - wheezing
- C - inapetență

**75-**Apariția cu regularitate a 2 extrasistole la un ciclu normal cardiac, reprezintă:

- A - bigeminism
- B - trigeminism
- C - intoxicație digitalică

**76-**În toxiinfecțiile alimentare cu Salmonella, incubația este:

- A - 14 zile
- B - 10 zile
- C - 4- 48 ore

**77-**Sputa cu aspect perlat este specifică:

- A - astmului bronșic
- B - chistului hidatic
- C - edemului pulmonar

**78-**Valoarea temperaturii corpului sub limita de 36°C se numește:

- A - Hipotermie
- B - Afebrilitate
- C - Hiperpirexie

**79-**Tifosul exantematic poate fi transmis de:

- A - purici
- B - păduchi
- C - țânțari

**80-**Nou născutul dintr-o sarcină cu durata de peste 42 săptămâni este:

- A - prematur
- B - postmatur
- C - dismatur

**81-**Loja renală este limitată posterior de:

- A - ultimele două coaste
- B - viscerele abdominale
- C - diafragm

**82-**Printre manifestările de dependență posibile la un pacient cu problema de îngrijire „Sentiment de neputință” se regăsesc:

- A - stări alergice însoțite de prurit
- B - modificarea pulsului și a tensiunii arteriale
- C - refuzul de a participa la luarea deciziilor

**83-**Durerea abdominală viscerală în afecțiunile digestive este descrisă de pacient ca o:

- A - „gheară”
- B - „arsură”
- C - „sufocare”

**84-**Reumatismul articular acut (Bouillaud) este o boală:

- A - post-gonococică
- B - post-streptococică
- C - post-stafilococică

**85**-În caz de stop cardiorespirator, tratamentul:

- A - este independent de diagnostic
- B - începe după stabilirea diagnosticului
- C - începe simultan cu stabilirea diagnosticului

**86**-Nodulul sinusal (Keith și Flack) emite stimuli cu o frecvență de:

- A - 40- 50 /min
- B - 60- 80/ min
- C - 30- 40 /min

**87**-Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale:

- A - nu există obligația de transmitere a acestor informații
- B - se transmit Ministerului Sănătății
- C - se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI

**88**-În vulvovaginita cu trichomonas, leucoreea are:

- A - culoare verzuie, fluidă, spumoasă cu miros fad
- B - culoare galben purulentă și este însoțită frecvent de cistită
- C - culoare albă, grunjoasă, abundentă, pruriginoasă

**89**-Agentul ciumei (Yersinia pestis) poate fi transmis de:

- A - țânțari
- B - purici
- C - căpușe

**90**-Dispneea Kussmaul se caracterizează printr-o:

- A - rigiditate a cutiei toracice și pierderea elasticității parenchimului pulmonar
- B - respirație de amplitudine progresiv crescândă care scade până la apnee de 10-15 secunde și ciclul se reia
- C - bradipnee accentuată, cu o inspirație profundă și zgomotoasă urmată de o pauză lungă și apoi o expirație lungă și iar pauză

**91**-Mătăniile costale, șanțul submamar, toracele evazat la baze, sunt semne ale:

- A - tetaniei rahitigene
- B - rahitismului incipient
- C - rahitismului florid

**92**-Cantitatea de aer expirată în prima secundă și măsurată spirometric, este notată astfel:

- A - VER
- B - VGT
- C - VEMS

**93**-La examenul radiologic, stomacul apare ca litera:

- A - "S"
- B - "V"
- C - "J"

**94-**Citirea reacției la testarea cutanată tuberculinică se realizează după administrare, la un interval de:

- A - 24 h
- B - 72 h
- C - 48 h

**95-**Sindromul clinic caracterizat printr-o insuficiență circulatorie acută, având ca expresie clinică prăbușirea tensiunii arteriale, se numește:

- A - șoc
- B - septicemie
- C - cașexie

**96-**În degerătura de gradul II, III și IV se recomandă:

- A - scufundarea în apă la 40-42 grade Celsius timp de 15-20 min
- B - frecarea zonei afectate cu gheață sau zăpadă
- C - încălzirea regiunii prin contact direct cu căldura corpului

**97-**Sanctiunile disciplinare pe care consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Români le pot aplica sunt următoarele:

- A - mustrarea și avertismentul
- B - retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei
- C - suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă

**98-**În insuficiența circulatorie cerebrală tranzitorie, pacientul prezintă:

- A - paralizii „în basculă”
- B - tulburări de vorbire, hemianopsie, pareze clinice
- C - tetraplegie

**99-**Nevoia de ingerare a unor cantități mari de alimente în dorința de obținere a sațietății, se numește:

- A - polifagie
- B - bulimie
- C - hiperorexie

**100-**Dintre tulburările vegetative ale pacientului cu boală Parkinson, fac parte:

- A - hipertensiunea arterială ortostatică
- B - hipersialoreea, hipersecreția sebacee, hipersudorația
- C - hiposialoreea, hiposecreția sebacee, hiposudorația