

## TEST-GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

**1-**Contraindicațiile absolute ale extracției dentare sunt:

- A - dinții cu raporturi sinusale
- B - dinții incluși
- C - leucemia acută și Infarctul miocardic recent

**2-**Formarea tartrului dentar presupune:

- A - microorganismele plăcii dentare necesită pH alcalin
- B - nu este favorizat de prezența bacteriilor
- C - mineralizarea plăcii dentare mature

**3-**Tuberculul piriform ocupă:

- A - zona premolarilor mandibulari
- B - regiunea molarului de minte inferior
- C - zona centrală a bolții palatine

**4-**Adeziunea la proteza totală depinde de:

- A - întinderea suprafeței plane orizontale cu care vine în contact proteza
- B - mărimea tuberozităților maxilare
- C - volumul creștelor edentate

**5-**Spasmul glotic poate fi provocat de:

- A - intoxicații cu substanțe convulsivante
- B - proteze dentare deplasate sau rupte
- C - înec

**6-**Asistenților medicali generaliști, moșelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică:

- A - pe o perioadă de 6 luni
- B - până la realizarea numărului minim de credite
- C - pe o perioadă de 12 luni

**7-Zona de sprijin a câmpului protetic mandibular este reprezentată de:**

- A - bolta palatină
- B - creasta edentată
- C - tuberozitatea maximală

**8-Precizați care variantă este adevărată din următoarele enunțuri:**

- A - între specialiștii medico-sanitari, informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient nu trebuie să fie comunicate
- B - asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical nu sunt obligați să asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA
- C - păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau tratament astfel de persoane

**9-Tumorile maligne au caracteristici generale:**

- A - nu dau metastaze
- B - evoluție lentă
- C - anatomo-clinic prezintă creștere continuă

**10-Clinic, tartrul se poate prezenta:**

- A - este mai puțin aderent ca tartrul supragingival
- B - tartrul subgingival descoperit pe suprafețele dentare care participă la constituirea șanțurilor gingivale și a pungilor parodontale
- C - este mai puțin dur ca tartrul supragingival

**11-Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale:**

- A - nu există obligația de transmitere a acestor informații
- B - se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI
- C - se transmit Ministerului Sănătății

**12-Tumorile maligne au caracteristici generale:**

- A - evoluție lentă
- B - recidivează local sau la distanță prin metastază
- C - sunt încapsulate

**13-Constituie încălcarea a regulilor etice:**

- A - înscrierea într-o organizație sindicală
- B - aprecierile în public sau pe rețelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în scopul de a induce în eroare opinia publică
- C - nerespectarea programului de lucru

**14-Care este autoritatea ce recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:**

A - Ministerul Sănătății

B - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

C - Ministerul Muncii

**15-Câmpul protetic edentat total este format din:**

A - zona de succiune

B - mucoasa pasiv mobilă

C - mucoasa mobilă

**16-Zdrobirea procesului alveolar necesită:**

A - rezecția apicală

B - reducerea manuală a fracturii și tratamentul luxațiilor dentare asociate, control periodic

C - extracția dentară a dintelui permanent

**17-Care este prima manoperă întreprinsă în insuficiența respiratorie:**

A - asigurarea și menținerea libertății căilor respiratorii

B - respirație artificială

C - oxigenoterapie

**18-Tumorile benigne au caracteristici generale:**

A - sunt bine delimitate

B - invadează țesuturile vecine

C - nu au plan de clivaj

**19-Tumorile maligne au caracteristici generale:**

A - evoluție rapidă

B - sunt încapsulate

C - nu dau metastaze

**20-Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:**

A - consum redus, rar, de glucide

B - prezența pH-urilor neutre

C - prezența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular

**21-Tumorile benigne au caracteristici generale:**

A - evoluție lentă

B - invadează țesuturile vecine

C - recidivează după extirpare

**22-Mucoasa pasiv-mobilă de închidere marginală are:**

A - o lățime între 1-3 mm

B - o lățime între 4-6 mm

C - o lățime între 2-4 mm

**23-**Insulina se păstrează:

- A - în congelator
- B - la rece (în frigider)
- C - în dulap de medicamente dar ferit de lumină

**24-**Sterilizarea urmărește:

- A - distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor
- B - dezinfectia căzilor, băilor, ploștilor
- C - profilaxia infecțiilor plăgilor operatorii

**25-**Indicația anesteziei nervului bucal interesează:

- A - anestezia limbii și a planșeului bucal
- B - anestezia completă pentru mucoasa gingivo-alveolară vestibulară situată distal de gaura mentonieră
- C - anestezia limbii

**26-**Indicația de Traheostomie vizează:

- A - în intoxicațiile voluntare
- B - tratarea infecțiilor pleuro-pulmonare
- C - traumatismele toracice cu fracturi costale multiple și volet costal

**27-**Contraindicațiile rezecției apicale vizează:

- A - dinții pluriradiculari
- B - premolarii maxilari
- C - dinții cu implantare compromisă

**28-**Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor este dată de:

- A - ingestia redusă de alimente îndulcite cu zahăr
- B - absența plăcii bacteriene
- C - flux salivar redus

**29-**Traumatismele deonto-parodontale ale dinților permanenți- Luxația laterală, necesită:

- A - șlefuirea coronară
- B - reducerea manuală în poziție corectă
- C - rezecția apicală

**30-**Fractura radiculară a dinților permanenți; fractura verticală necesită:

- A - extracția
- B - rezecția apicală
- C - remodelarea coronară (coronoplastia)

**31-**Îndepărtarea plăcii dentare se poate face:

- A - prin clătire
- B - placa dentară nu se îndepărtează prin clătire
- C - prin proiectarea jetului de apă

**32-**Indicațiile rezecției apicale pot fi:

- A - în fractura radiculară în 1/3 cervicală
- B - în canale cu curburi accentuate
- C - în abraziunea coronară accentuată

**33-**Câmpul protetic edentat total este format din:

- A - zona de sprijin
- B - mucoasa pasiv mobilă
- C - mucoasa mobilă

**34-**Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:

- A - distrucții corono-radiculare avansate
- B - fracturi coronare cu afectarea camerei pulpare
- C - distrucții corono-radiculare reduse

**35-**Buza de iepure reprezintă:

- A - despicătura cerului gurii și a vălului palatin
- B - despicătura parțială a vălului palatin
- C - despicătura numai a buzei superioare

**36-**Siliconii de adiție au cele mai mici modificări:

- A - 0,41%
- B - 0,15%
- C - 0,20%

**37-**În tratamentul accidentelor extracției dentare-Luxația ATM:

- A - nu se finalizează extracția dentară
- B - continuarea tratamentului se va realiza în secții OMF
- C - se practică reducerea luxației și imobilizarea de urgență a mandibulei

**38-**Chisturile părților moi orale-chistul dermoid presupune:

- A - adiție osoasă
- B - extirpare prin abordare orală/cutanată, în funcție de localizare
- C - antibioterapie

**39-**Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt:

- A - competența, corectitudinea și comunicarea
- B - profesionalismul, cooperarea și empatia
- C - experiența profesională, responsabilitatea și cinstea

- 40-**Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:
- A - când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
  - B - în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală
  - C - pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului
- 41-**Depozitele dentare moi-pelicula dobândită:
- A - reprezintă un depozit moale, subțire, format din glicoproteine de origine salivară
  - B - favorizează demineralizarea
  - C - împiedică menținerea umidității suprafețelor
- 42-**Clinic, tartrul se poate prezenta:
- A - tartrul supragingival, în treimea gingivală coronară, la frontali inferiori, lingual; la molarii superiori vestibular
  - B - culoarea la maturare a tartrului este alb-gălbuie
  - C - în zonele dentare expuse unei masticații intense
- 43-**Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:
- A - dinții care necesită tratament endodontic
  - B - luxația completă a dinților
  - C - dinții care au suferit extruzia și egresiunea
- 44-**Mușchiul buccinator poate contribui la menținerea și stabilizarea protezei având:
- A - fibre musculare oblice pe marginea protezei
  - B - fibre musculare paralele cu marginea protezei
  - C - fibre musculare perpendiculare pe marginea protezei
- 45-**Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:
- A - nu permit reinsertia amprentei în cavitatea bucală
  - B - nu aderă pe suprafețele uscate
  - C - stabilitate remarcabilă
- 46-**Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor cariogene este dată de:
- A - flux salivar crescut
  - B - absența plăcii bacteriene
  - C - ingestia frecventă de alimente îndulcite cu zahăr
- 47-**Indicația anesteziei nervului mentonier și incisiv implică:
- A - anestezia limbii
  - B - intervenții chirurgicale labio-mentoniere când anestezia locală prin infiltrație deformează regiunea
  - C - anestezia buzei superioare

**48-**Placa dentară generatoare de tartru dentar are următoarea caracteristică:

- A - nu este influențată de alimentație
- B - nu este influențată de controlul mecanic al plăcii
- C - prin compoziția microbiană prezentă în placă pot fi generate cantități mari de tartru

**49-**Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:

- A - nu permit reinsertia amprentei în cavitatea bucală
- B - nu aderă pe suprafețele uscate
- C - au rezistență suficient de mare după amprentare

**50-**Gura de lup constă în:

- A - despicătura numai a buzei superioare
- B - despicătura bolții palatine
- C - despicătura buzei superioare și a cerului gurii

**51-**Placa dentară-aspecte clinice:

- A - este influențată de tipul alimentelor consumate
- B - nu este influențată de tipul de masticăție
- C - nu este influențată de mobilitatea părților moi

**52-**Parodontita este:

- A - o inflamație a cavității bucale
- B - o afecțiune a gingiilor
- C - o boală care atacă țesuturile de susținere a dinților

**53-**Depozitarea medicamentelor se face în:

- A - dulapuri speciale
- B - noptiere
- C - dulapuri compartimentate

**54-**Resuscitarea respiratorie este indicată în:

- A - insuficiența respiratorie acută
- B - congestia pulmonară
- C - pleurezie

**55-**Indicațiile extracției dinților temporari sunt la:

- A - dinți temporari fără mobilitate
- B - dinți temporari care împiedică erupția celor permanenți
- C - dinți temporari cu carii incipiente

**56-**Placa dentară cariogenă este favorizată de:

- A - consumul de carbohidrați ce conduce la apariția pH-ului acid cu facilitarea demineralizării
- B - prezența fluorului în structurile dentare ce facilitează demineralizarea
- C - cantitatea scăzută de salivă (Xerostomia) ce scade efectul demineralizant

**57-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în pungi de hârtie/plastic sigilate este de:**

- A - 48 ore
- B - 2 luni
- C - 1 săptămână

**58-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în hârtie specială (ambalaj în două straturi de hârtie) este de:**

- A - 1 lună
- B - 3 luni
- C - 2 luni

**59-Zona de sprijin a câmpului protetic maxilar este reprezentată de:**

- A - creasta edentată
- B - linia oblică externă
- C - linia oblică internă

**60-Tumorile benigne au caracteristici generale:**

- A - nu sunt bine delimitate
- B - nu interesează ganglionii limfatici
- C - nu au plan de clivaj

**61-Plastia șanțurilor periosoase la mandibulă se indică în:**

- A - șanțul vestibular adânc
- B - fundul de sac lărgit
- C - atrofia osoasă severă

**62-Placa dentară - aspecte clinice:**

- A - nu este influențată de tipul de masticație
- B - nu este influențată de tipul de alimente
- C - se poate colora datorită fumatului și/sau aportului de medicamente

**63-Indicația anesteziei nervului alveolar inferior (Spina Spix) interesează:**

- A - bolta palatină
- B - aria inervată de nervul bucal
- C - gingivomucoasa vestibulară pe o hemiarcadă

**64-Tumorile benigne au caracteristici generale:**

- A - nu recidivează după extirpare
- B - interesează ganglionii
- C - evoluție rapidă, fulminantă

**65-Tumorile maligne au caracteristici generale:**

- A - evoluție lentă
- B - nu dau metastaze
- C - invadează țesuturile



**66-**Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:

A - Ministerul Educației

B - Ministerul Sănătății

C - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

**67-**Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite:

A - alterarea profundă a stării generale, Hipotensiune, stare de șoc

B - tumefacția mucoaselor

C - salivația abundentă

**68-**Sialolitiza, submaxilectomia presupune:

A - instilații endo-canaliculare cu ser fiziologic

B - masaj local și stimularea reflexă a secreției salivare

C - calculi multipli, recidive frecvente

**69-**Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2008, cu modificările și completările ulterioare constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor :

A - altor acte normative

B - Codului administrativ

C - Codului penal

**70-**Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:

A - aderă pe suprafețele uscate

B - nu permit reinsertia amprentei în cavitatea bucală

C - au rezistență suficient de mare după amprentare

**71-**Prelungirea perioadelor de activitate orală a microorganismelor este dată de:

A - flux salivar crescut

B - acumularea plăcii bacteriene

C - ingestia redusă de alimente îndulcite cu zahăr

**72-**Administrarea medicamentelor de către asistentul medical se face în condiții:

A - de igienă, asepsie, dezinfecție și menținerea normelor de control a infecțiilor

B - de igienă, asepsie și sterilizare

C - de dezinfecție

**73-Avantajele sterilizării prin abur sub presiune sunt:**

- A - este cea mai puțin economică metodă de sterilizare
- B - distruge rapid și eficient toate microorganismele, inclusiv spori și virusurile
- C - nu duce la corodarea instrumentelor metalice

**74-Tulburările asociate erupției molarului de minte inferior pot fi:**

- A - deglutiția infantilă
- B - flegmonul de planșeu oral
- C - inocluzia sagitală la nivelul molarilor 3

**75-Mucoasa fixă se află pe:**

- A - pe planșeul bucal
- B - pe obraji
- C - crestele edentate maxilare și mandibulare

**76-Tumorile benigne au caracteristici generale:**

- A - interesează ganglionii
- B - nu invadează țesuturile vecine
- C - recidivează după extirpare

**77-Tumorile maligne au caracteristici generale:**

- A - nu sunt bine delimitate
- B - au evoluție lentă
- C - nu recidivează

**78-Indicația anesteziei nervului palatin mare afectează:**

- A - anestezia fibromucoasei palatinale
- B - anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 anterioară
- C - anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 posterioară

**79-Placa dentară supragingivală reprezintă o:**

- A - depunere de placă pe suprafețe dentare lucioase
- B - depunere de placă pe lucrări protetice plane, lucioase
- C - depunere de placă favorizată de incongruența dento-alveolară cu înghesuire

**80-Caracteristica plăcii dentare generatoare de boală parodontală constă în :**

- A - grosimea și maturizarea plăcii nu crește capacitatea ei patogenă
- B - factorul etiologic local cel mai important în declanșarea și evoluția bolii parodontale este placa dentară
- C - microorganismele plăcii nu acționează distructiv direct

**81-Momentul optim de programare a pacientei însărcinate este:**

- A - se va programa dimineața
- B - în primul trimestru al sarcinii
- C - în cel de-al doilea trimestru al sarcinii

**82-Placa dentară-aspecte clinice:**

A - nu este influențată de tipul alimentelor

B - se definește ca: depozitul dentar moale, neuniform și aderent la structurile cavității orale

C - se acumulează în zonele de autocurățire

**83-Momentul optim de programare a pacientei însărcinate este:**

A - în ultimul trimestru al sarcinii

B - se evită programarea în cursul dimineții

C - în primul trimestru al sarcinii

**84-Sanțiunile disciplinare pe care consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:**

A - suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă

B - retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei

C - mustrarea și avertismentul

**85-Depozitul dentar dur-tartrul dentar:**

A - generează, în mod obișnuit probleme parodontale

B - nu este un factor etiologic al inflamației gingivale

C - este un depozit dur, calcificat, neaderent de structura dură dentară

**86-Prelungirea timpului de priză la alginat se poate face:**

A - folosind apă caldă

B - folosind apă rece

C - spatulare îndelungată

**87-Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de:**

A - 72 ore

B - 48 ore

C - 24 ore

**88-Placa dentară are în compoziție chimică:**

A - 80% apă și 20% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme

B - 20% apă și 80% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme

C - 60% apă și 20% substanță uscată, din care 70-80% microorganisme

**89-Extracția resturilor radiculare prin alveolotomie sunt la:**

A - rădăcinile situate sub limita procesului alveolar

B - resturile radiculare care pot fi vizualizate pe fundul alveolei

C - rădăcinile situate profund intraalveolar

**90-**Placa dentară-compoziție chimică:

A - se compune din 20% apă și 80% substanță uscată

B - se compune din 60% apă și 40% substanță uscată

C - se compune din 80% apă și 20% substanță uscată

**91-**Câte picături are 1 (un) gram de soluție apoasă:

A - 40-50 picături

B - 60-65 de picături

C - 20-25 picături

**92-**Produsele ZOE oferă următoarele avantaje:

A - nu necesită izolarea înaintea turnării modelului

B - nu aderă pe suprafețele uscate

C - nu permit reinsertia amprentei în cavitatea bucală

**93-**Provocarea hipoglicemiei poate fi atribuită:

A - unei doze prea mari de insulină

B - unui aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dietă

C - unei doze insulină mai mică decât cea prescrisă

**94-**Compoziția tartrului dentar este:

A - substanțe anorganice 8%, substanțe organice 75-85% și apă 15%

B - substanțe anorganice 15%, substanțe organice 75-85% și apă 8%

C - substanțe anorganice 75-85%, substanțe organice 15% și apă 8%

**95-**Garoul elastic se aplică deasupra locului puncției, la aproximativ:

A - 20 cm

B - 5 cm

C - 10 cm

**96-**Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:

A - absența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular

B - prezența pH-urilor acide

C - consum redus, rar, de glucide

**97-**Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:

A - prezența pH-urilor neutre

B - absența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular

C - consumul frecvent de glucide

**98-**Zona de succiune sau de închidere marginală este realizată de:

A - mucoasa de trecere între mucoasa fixă și mobilă

B - mucoasa mobilă

C - mucoasa fixă

**99**-Placa subgingivală:

- A - este influențată de prezența abundentă a salivei
- B - este favorizată de prezența lichidului crevicular (sulcular)
- C - se localizează în vecinătatea festonului gingival pe care îl inflamează

**100**-Fracturile complexului zigomatico-alveolar fără deplasare necesită:

- A - supraveghere, expectativă
- B - reducerea transgeniană
- C - reducerea prin abord cutanat