



Lista de întrebări

Specialitatea: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

1. **Triada caracteristică bolii Basedow este:**
 - a) Gușă, tireotoxicoză și exoftalmie
 - b) Gușă, bradicardie și mixedem
 - c) Gușă, hipotiroidism și exoftalmie
2. **Cea mai frecventă manifestare clinică la pacientul cu hemofilie este:**
 - a) Hematuria
 - b) Hematemeza
 - c) Hemartroza
3. **Prima etapă în abordarea pacientului aflat în comă este:**
 - a) Administrarea orală a medicamentelor
 - b) Stabilizarea funcțiilor vitale
 - c) Efectuarea imediată a CT-ului cranian
4. **Locul de elecție recomandat pentru administrarea subcutanată a insulinei cu acțiune rapidă este:**
 - a) Fesa
 - b) Gamba
 - c) Abdomenul (cu excepția zonei de 5 cm din jurul ombilicului)
5. **Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România este o organizație profesională:**
 - a) cu responsabilități delegate de Ministerul Educației
 - b) neguvernamentală
 - c) politică
6. **Unul dintre criteriile scorului APGAR este:**
 - a) tranzitul
 - b) temperatura
 - c) respirația

7. **Simptomul dominant în edemul pulmonar acut (EPA) este:**
- a) Durerea abdominală
 - b) Dispneea cu ortopnee, cu instalare acută
 - c) Hematuria
8. **Prin excepție de la cerințele cumulative de formare, cetățenie, filiație și rezidență, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat terț pot exercita temporar profesia cu avizul:**
- a) Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medical din România
 - b) Direcției de Sănătate Publică pe teritoriul căreia se află unitatea sanitară în care își vor desfășura activitatea
 - c) Direcției de Resurse Umane din cadrul Ministerului Sănătății
9. **În arsuri indicele prognostic se calculează în funcție de:**
- a) profunzimea leziunii
 - b) mărimea suprafeței tegumentare afectată
 - c) mărimea suprafeței tegumentare și profunzimea leziunii
10. **Sindromul fizic caracteristic pneumoniei lobare este:**
- a) Matitate, respirație suflantă și raluri crepitante
 - b) Absența modificărilor stetacustice
 - c) Raluri subcrepitante difuze bilateral
11. **Forma de rezervă a glucidelor în organism poartă numele de:**
- a) Glucoză
 - b) Glucagon
 - c) Glicogen
12. **În cadrul testului de toleranță orală la glucoză (TTGO), valoarea glicemiei la 2 ore ce stabilește diagnosticul de diabet zaharat este:**
- a) ≥ 160 mg/dL
 - b) ≥ 140 mg/dL
 - c) ≥ 200 mg/dL
13. **În procesul de digestie intervine și un lichid incolor, cu reacție alcalină care conține trei fermenți: tripsina, amilaza, lipaza. Acesta este:**
- a) Sucul gastric
 - b) Bila (secreția biliară)
 - c) Sucul pancreatic

- 14. Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităților de asistent medical generalist, moașă și asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către:**
- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) Ministerul Sănătății
 - c) Ministerul muncii , familiei, tineretului și solidarității sociale
- 15. Unul dintre semnele de dependență în „Eliberarea inefficientă a căilor respiratorii” este:**
- a) Corpi străini în căile respiratorii
 - b) Fumatul
 - c) Dispnee cu tahipnee
- 16. Specificul activității de nursing comunitar se caracterizează prin:**
- a) abordare centrată pe boală.
 - b) îngrijire și spitalizare cu mijloacele societății
 - c) îngrijire la domiciliu cu mijloacele pacientului
- 17. În alimentarea activă sau pasivă a pacientului, asistentul medical face pregătirea psihică prin:**
- a) Așezarea pacientului într-o poziție confortabilă
 - b) Acordarea de ajutor pacientului în spălarea mâinilor
 - c) Încurajarea pacientului și stimularea autonomiei
- 18. Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:**
- a) Ministerul Educației
 - b) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în colaborare cu Ministerul Sănătății
 - c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- 19. Din punct de vedere topografic abdomenul este împărțit în 9 regiuni sau cadrane. În hipocondrul stâng se găsesc:**
- a) Stomac, splină, coada pancreasului
 - b) Colon ascendent, duoden, jejun
 - c) Apendice și cec, porțiunea terminală a ileonului
- 20. Agentul etiologic cel mai frecvent implicat în endocardita bacteriană subacută (lentă) este:**
- a) Pneumococul
 - b) Streptococul viridans
 - c) Stafilococul auriu

- 21. Indicele de masă corporală normal, fără risc de boală, are limită maximă situată până în:**
- a) 15
 - b) 30
 - c) 25
- 22. Activitatea de îngrijiri generale de sănătate se exercită cu titlul profesional de:**
- a) asistent medical generalist
 - b) asistent medico-social
 - c) asistent medical
- 23. Măsura care trebuie efectuată imediat după îndepărtarea în siguranță a victimei unei electrocutări este:**
- a) Aplicarea directă a gheții pe arsurile electrice
 - b) Începerea resuscitării cardio-respiratorii, dacă este necesară
 - c) Administrarea de alimente și lichide pe cale orală
- 24. Unul dintre elementele funcționale ale procesului de comunicare este „emitentul” care reprezintă:**
- a) Orice răspuns solicitat, primit, ascultat sau decodificat
 - b) Orice persoană căreia îi este adresată comunicarea
 - c) Orice sursă de apelare, producere, inițiere, transmitere de informații
- 25. Cea mai gravă cauză de hematemză este:**
- a) Gastrita acută
 - b) Ruptura varicelor eso-gastrice din hipertensiunea portală a cirozelor hepatice
 - c) Ulcerul duodenal necomplicat
- 26. Vacutainerul fără aditivi (cu dop roșu) este utilizat pentru:**
- a) Dozarea VSH
 - b) Analize biochimice
 - c) Analize hematologice
- 27. Cauza principală a infarctului miocardic este:**
- a) Ateroscleroza coronariană
 - b) Endocardita bacteriană
 - c) Hipertensiunea arterială

- 28. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:**
- a) Ministerul Sănătății
 - b) Ministerul Educației
 - c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- 29. Alegerile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară:**
- a) o dată la 4 ani
 - b) anual
 - c) o dată la 5 ani
- 30. Alternanța dintre perioade de polipnee și episoade de apnee cu durata de 10–30 de secunde caracterizează:**
- a) Respirația Cheyne-Stokes
 - b) Respirația Biot
 - c) Respirația Kussmaul
- 31. Unul dintre obiectivele planului de îngrijire în „Durerea cronică” este:**
- a) Lipsa de cunoștințe despre mijloacele de control ale durerii
 - b) Pacientul să exprime diminuarea durerii în decurs de ... ore
 - c) Interacțiune scăzută cu alte persoane
- 32. Există în cultura noastră o legătură între forma corpului, aspectul extern și personalitate. „Tipul endomorf” este:**
- a) Fragil, subțire și înalt
 - b) Gras, rotund și scurt
 - c) Musculos, athletic, înalt
- 33. Cea mai frecventă cauză a șocului cardiogen, este:**
- a) Infarctul miocardic acut
 - b) Deshidratarea severă
 - c) Reacția anafilactică
- 34. Simptomul-cheie al insuficienței renale acute (IRA) este:**
- a) Hematurie macroscopică
 - b) Oligoanurie (diureză sub 400–500 ml/24 h)
 - c) Poliurie persistentă

- 35. Nou născutul prezintă fire de perișori fini pe spate care se vor detașa singure în zilele următoare nașterii. Acestea se numesc:**
- a) milium
 - b) vernix caseosa
 - c) lanugo
- 36. Sursa de dificultate în problema de dependență „Diareea” poate fi:**
- a) Crampe abdominale
 - b) Tenesme rectale
 - c) Intoxicația cu alimente sau medicamente
- 37. În România , profesiile de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical se exercită de către posesorii unui titlu oficial de calificare după caz, în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moașă și, respectiv, de asistent medical care:**
- a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat tert
 - b) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene
 - c) sunt cetățeni ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai unui stat tert
- 38. Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se eliberează:**
- a) după promovarea reatestării profesionale
 - b) la înscrierea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) anual
- 39. Măsura de urgență esențială în intoxicația cu monoxid de carbon este:**
- a) Administrarea imediată de lichide reci
 - b) Provocarea vărsăturilor
 - c) Scoaterea victimei din mediul toxic și administrarea precoce de oxigen
- 40. Cantitatea de salivă secretată în 24 de ore este de regulă de:**
- a) 1000 - 1500 ml
 - b) 200 - 300 ml
 - c) 500 - 800 ml

- 41. Secretul profesional este obligatoriu:**
- a) față de aparținători
 - b) față de colegi sau alte persoane din sistemul sanitar
 - c) față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului cu excepția situației în care pacientul și-a exprimat consimțământul
- 42. Cantitatea standard de glucoză administrată la adult în testul de toleranță orală la glucoză (TTGO) este:**
- a) 75 g glucoză dizolvată în 200 ml apă
 - b) 50 g glucoză dizolvată în apă
 - c) 100 g glucoză dizolvată în 500 ml apă
- 43. Reatestarea competențelor profesionale de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este necesară:**
- a) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali aflați în primii 5 ani de la dobândirea titlului de calificare
 - b) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu fac dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 1 an în ultimii 5 ani anterior datei solicitării certificatului de membru și/sau avizului anual
 - c) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali aflați în primii 4 ani de la dobândirea titlului de calificare
- 44. Hemoglobina glicozilată (HbA1c) reflectă:**
- a) Media valorilor glicemiei din ultimele 2-3 luni
 - b) Glicemia din momentul recoltării
 - c) Funcția renală din ultimele 24 de ore
- 45. Aerul este un amestec de gaze și vapori de apă. În aerul inspirat într-un procent de 78 - 79 % se află:**
- a) Oxigen
 - b) Dioxid de carbon
 - c) Azot
- 46. Asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical aflat în stare de incompatibilitate este obligat să anunțe filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România al cărui membru este, în termen de:**
- a) 30 de zile de la apariția acesteia
 - b) 10 zile de la apariția acesteia
 - c) 48 de ore de la apariția acesteia

47. **În meningită bolnavul are o poziție patognomonică:**
- a) Poziție Trendelenburg
 - b) Poziție „cocoș de pușcă"
 - c) Poziție opistotonus
48. **Care dintre următoarele este comă metabolică:**
- a) coma alcoolică
 - b) coma postepileptică
 - c) coma uremică
49. **Reglarea funcției renale se realizează printre altele și printr-un hormon retrohipofizar. Acesta este:**
- a) Hormonul antidiuretic
 - b) Tiroxina
 - c) Renina
50. **Vitamina B2 se mai numește:**
- a) Tiamină
 - b) Riboflavină
 - c) Piridoxină
51. **Prima măsură terapeutică în cazul stopului cardio-circulator este:**
- a) Administrarea de nitroglicerină sublingual
 - b) Administrarea de analgezice
 - c) Începerea imediată a masajului cardiac extern (resuscitare cardiopulmonară)
52. **Investigația care stabilește tipul și severitatea hemofiliei este:**
- a) Numărul trombocitelor
 - b) Dozarea factorilor de coagulare VIII și IX
 - c) Timpul de sângerare
53. **Controlul și supravegherea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical se face de către:**
- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) Ministerul Sănătății
 - c) Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România

- 54. Principalul factor determinant în apariția gușii endemice este:**
- a) Excesul de vitamina D
 - b) Carența de iod
 - c) Excesul de calciu
- 55. Unul dintre factorii fizici care influențează nevoia de a respira este:**
- a) Clima
 - b) Postura
 - c) Emoția
- 56. Care dintre următoarele aritmii cardiace face parte dintre tulburările de conducere a stimulului:**
- a) Fibrilația atrială
 - b) Blocul de ramură
 - c) Tahicardia paroxistică
- 57. Una dintre tulburările de diureză este:**
- a) Nicturia
 - b) Oliguria
 - c) Polakiuria
- 58. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:**
- a) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
 - b) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord
 - c) în cazul supunerii la orice fel de intervenție medicală
- 59. Prima intervenție în tratamentul unei crize de angină pectorală este:**
- a) Întreruperea efortului și administrarea sublinguală de nitroglicerină
 - b) Administrarea de antibiotice
 - c) Administrarea de diuretice
- 60. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România acordă asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat terț aviz de exercitare temporară a profesiei în scop didactic și ocazional, sau în cadrul acțiunilor umanitare, al situațiilor de urgență, sau în cadrul schimburilor de experiență și al convențiilor încheiate cu statul ței de proveniență al acestora:**
- a) pentru o perioadă de 3 luni, fara posibilitatea de prelungire
 - b) pentru o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă 6 luni pe an
 - c) pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an

- 61. Se deosebesc mai multe nuanțe de icter în funcție de etiologie. În afecțiunile biliare obstructive apare:**
- a) Icter verdin
 - b) Icter flavin
 - c) Icter rubin
- 62. Simptomul cel mai caracteristic al infarctului miocardic acut este:**
- a) Durere toracică intensă, prelungită, care nu cedează la nitroglicerină
 - b) Febră înaltă cu frisoane
 - c) Tuse productivă
- 63. Unul dintre rolurile asistentului medical în echipa medicală este:**
- a) Monitorizează starea generală și funcțiile vitale ale pacientului
 - b) Evaluează rezultatele analizelor de laborator și a investigațiilor
 - c) Planifică data externării pacientului
- 64. Un prematur de gradul II are greutatea cuprinsă între:**
- a) 2000 - 2500 g
 - b) 1000 - 1500 g
 - c) 1500 - 2000 g
- 65. Filialele județene și filiala municipiului București ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:**
- a) nu au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) au personalitate juridică și nu beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- 66. Investigația obligatorie pentru confirmarea diagnosticului de BPOC este:**
- a) Spirometria
 - b) Radiografia pulmonară
 - c) Electrocardiograma

- 67. Pneumonia franc-lobară este cauzată de:**
- a) enterococ
 - b) pneumococ
 - c) stafilococ
- 68. Prezența flictenei albe cu conținut serocitrin limpede, transparent o întâlnim în arsura de:**
- a) gradul I
 - b) gradul III
 - c) gradul II
- 69. În procesul de comunicare „feed-back” – ul este:**
- a) Reacție la mesajul primit
 - b) Structurarea informațiilor în semne și simboluri
 - c) Drumul ipotetic prin care circulă mesajul
- 70. Dispozițiile cu privire la libera prestare a serviciilor se aplică asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care sunt stabiliți în vederea exercitării profesiei în unul din aceste state, atunci când:**
- a) se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar sau ocazional activitățile profesionale
 - b) își schimbă locul de muncă în statul de stabilire
 - c) în nici una din situațiile de mai sus
- 71. Sputa seroasă, aerată, spumoasă, rozată este întâlnită în:**
- a) Bronșita acută
 - b) Edemul pulmonar cardiogen
 - c) Pneumonia pneumococică
- 72. Manifestările tardive caracteristice cirozei hepatice sunt:**
- a) Hipertensiune portală, ascită și insuficiență hepatică
 - b) Colică biliară și icter obstructiv
 - c) Tuse, hemoptizie și febră
- 73. În proxemică sau limbajul spațiului, zona intimă este considerată a fi:**
- a) între 46 cm - 122 cm
 - b) mai mică de 46 cm
 - c) între 122 - 220 cm

- 74. Febra nocturnă (inversă) este caracteristică:**
- a) Pneumoniei pneumococice
 - b) Tuberculozei
 - c) Malariei
- 75. Pneumoniile se pot clasifica din punct de vedere etiologic în:**
- a) Infecțioase / neinfecțioase
 - b) Complicate/ necomplicate
 - c) Primitive / secundare
- 76. Stimularea simpaticului are ca efect:**
- a) scăderea frecvenței cardiace
 - b) bronhodilatație
 - c) creșterea secreției sudoripare
- 77. Manifestarea clinică caracteristică litiazei renale este:**
- a) Hipertensiunea arterială
 - b) Edemele gambiere
 - c) Colica nefretică
- 78. Șocul neurogen apare de regulă în:**
- a) Pierderile importante de sânge
 - b) Traumatismele craniene
 - c) Infarctul miocardic
- 79. Care din următoarele enunțuri cu privire la surorile medicale și oficianții medicali este adevărat:**
- a) nu sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) sunt membri asociați ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) nu au obligația de a se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- 80. IDR-ul după administrarea tuberculinei se citește la:**
- a) 48 ore
 - b) 72 ore
 - c) 24 ore

81. Caracteristica specifică hemoptiziei este:

- a) Eliminarea sângelui precedată de greață și vărsături
- b) Sânge roșu-viu, spumos, cu reacție alcalină
- c) Sânge închis la culoare, cu reacție acidă

82. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:

- a) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical
- b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei
- c) proceduri de practică pentru asistenți medicali

83. În stabilirea planului de îngrijire pentru diagnosticul „Eliberarea inefficientă a căilor respiratorii” unul dintre obiective este:

- a) Pacientul să își mențină căile respiratorii permeabile
- b) Eliberarea căilor respiratorii prin aspirare
- c) Administrarea oxigenului

84. Vitaminele hidrosolubile includ:

- a) Vitamina A
- b) Vitamina C
- c) Vitamina D

85. În cazul sindromului de strivire îndelungată, eliberarea bruscă și nehibzuită a membrului strivit poate determina:

- a) Agravarea bruscă a stării pacientului, prin pătrunderea în sânge a toxinelor din țesuturile strivite
- b) Scăderea riscului de șoc
- c) Vindecarea spontană a leziunilor

86. Simptomul cardinal al glomerulonefritei acute difuze este:

- a) Hematurie
- b) Piurie
- c) Nicturie

87. Anemia determinată de carența de fier este:

- a) Anemie microcitară
- b) Anemie macrocitară
- c) Anemie normocitară

- 88. Starea de hiperexcitabilitate neuromusculară care apare în perioada de ameliorare a rahitismului poartă numele de:**
- a) rahitism florid
 - b) tetanie rahitigenă
 - c) rahitism carențial
- 89. Simptomul caracteristic al anginei pectorale de efort este:**
- a) Durere retrosternală constrictivă, apărută la efort și care cedează la repaus sau nitroglicerină
 - b) Durere toracică ce durează peste 30 de minute și nu cedează la nitroglicerină
 - c) Durere localizată în hipocondrul drept, după mese
- 90. Investigația care apreciază rezervele de fier ale organismului în anemia feriprivă este:**
- a) Hemoleucograma
 - b) Reticulocitele
 - c) Feritina
- 91. Tusea bitonală poate sugera:**
- a) Astm bronșic
 - b) Pneumonie pneumococică
 - c) Leziunea nervului recurent stâng prin tumori compresive sau anevrism de aortă
- 92. Măsura recomandată în tratamentul conservator al varicelor este:**
- a) Evitarea mersului pe jos
 - b) Purtarea ciorapilor elastici și evitarea ortostatismului prelungit
 - c) Repaus strict la pat, permanent
- 93. Sunt acizi grași „esențiali” următorii:**
- a) Acidul palmitic, acidul stearic
 - b) Acidul linoleic, acidul linolenic
 - c) Acidul oleic, acidul palmitic
- 94. Evaluarea pacientului în faza inițială a unui traumatism cranian se face cu:**
- a) scorul GLASGOW
 - b) scorul APGAR
 - c) scala BARTHEL
- 95. Melena este definită ca:**
- a) Eliminarea de sânge roșu prin rect
 - b) Scaun negru, lucios ca păcura, care persistă câteva zile după oprirea hemoragiei
 - c) Eliminarea de sânge prin vărsătură

- 96. Asistentul medical generalist și moașa exercită activitățile profesionale cu asumarea responsabilității :**
- a) numai pentru evaluarea și furnizarea serviciilor
 - b) pentru planificarea, organizarea, evaluarea și furnizarea serviciilor
 - c) numai pentru planificarea și organizarea serviciilor furnizate
- 97. Manifestarea care sugerează prezența unei hemoragii interne în cazul unui traumatism abdominal este:**
- a) Tegumente calde și eritematoase, cu hiperactivitate
 - b) Tegumente umede, reci și palide, sete intensă și oligoanurie
 - c) Exclusiv creșterea temperaturii corporale
- 98. Agentul etiologic responsabil de apariția reumatismului articular acut (RAA) este:**
- a) Virusul Epstein-Barr
 - b) Stafilococul auriu
 - c) Streptococul β -hemolitic de grup A
- 99. În problema de dependență „Perturbarea mobilității fizice” unul dintre obiectivele de îngrijire poate fi:**
- a) Pacientul să se ridice singur în decurs de ... zile
 - b) Se învață pacientul să execute exerciții pentru creșterea tonusului muscular
 - c) Se solicită pacientului să participe în timpul exercițiilor de mobilizare și se consemnează progresele
- 100. Una dintre complicațiile de temut ale tromboflebitei este:**
- a) Nevralgia persistentă
 - b) Varicele
 - c) Embolia pulmonară