



Lista de întrebări

Specialitatea: MOAȘĂ

1. **Amnioscopia permite evaluarea cantitativă și calitativă a lichidului amniotic și se efectuează începând cu:**
 - a) 36 săptămâni de sarcină
 - b) 42 săptămâni de sarcină
 - c) 12 săptămâni de sarcină

2. **Întărcarea precoce poate provoca traumatisme psiho-afective la copil care pot provoca ulterior:**
 - a) Apariția autismului
 - b) Probleme comportamentale
 - c) Afecțiuni ale sistemului circulator

3. **În prezența pelviană, partea fetală care se prezintă la strâmtoarea superioară este:**
 - a) Un membru superior
 - b) Pelvisul
 - c) Bregma

4. **Care este tratamentul de elecție al incontinenței urinare de efort?**
 - a) Tratamentul chirurgical
 - b) Administrarea de diuretice
 - c) Tratamentul cu antispastice

5. **Secretul profesional este obligatoriu:**
 - a) față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului cu excepția situației în care pacientul și-a exprimat consimțământul
 - b) față de aparținători
 - c) față de colegi sau alte persoane din sistemul sanitar

6. **Cardiotocografia (CTG) sau testul fetal non-stres presupune:**
 - a) Monitorizarea cordului fetal timp de aproximativ 20 de minute, în corelație cu mișcările fetale, precum și monitorizarea contracțiilor uterine
 - b) Evaluarea ecografică a morfologiei fetale și măsurarea fluxului sanguin prin arterele uterine
 - c) Înregistrarea activității cardiace fetale exclusiv în timpul contracțiilor uterine

7. **Dispozițiile cu privire la libera prestare a serviciilor se aplică asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care sunt stabiliți în vederea exercitării profesiei în unul din aceste state, atunci când:**
- a) își schimbă locul de muncă în statul de stabilire
 - b) se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar sau ocazional activitățile profesionale
 - c) în nici una din situațiile de mai sus
8. **În cadrul recoltării testului Babeș-Papanicolau, de la nivelul endocervical recoltarea se efectuează cu:**
- a) Tampon de vată
 - b) Perie cilindrică
 - c) Spatulă Ayre
9. **Fiecare trompă uterină are o lungime de aproximativ:**
- a) 3 centimetri
 - b) 20 centimetri
 - c) 10 centimetri
10. **În vulvovaginita micotică (infecția cu candida albicans), leucoreea este:**
- a) Albă, grunjoasă, abundentă, pruriginoasă
 - b) Mucoasă, gri-cenușie, însoțită de cistită
 - c) Galben-purulentă, păstoasă
11. **Filialele județene și filiala municipiului București ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:**
- a) nu au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) au personalitate juridică și nu beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
12. **Pentru recoltarea Hemoleucogramei (HLG) avem nevoie de tub de recoltare cu vid (vacutainer) care conține:**
- a) Citrat de sodium
 - b) Heparină
 - c) EDTA

13. Singurul simptom al placentei praevia este:

- a) Durerile pelvi-abdominale
- b) Hipertensiune arterială
- c) Hemoragia

14. Urocultura se recoltează:

- a) Doar dacă pacienta are vezica urinară plină și senzație de a urina
- b) La 14 zile după administrarea ultimei doze de antibiotic
- c) Înaintea începerii tratamentului cu antibiotic

15. Care sunt rolurile chiuretajului uterin:

- a) Exclusiv terapeutic
- b) Hemostatic (terapeutic) și biopsic (diagnostic)
- c) Exclusiv diagnostic

16. Sterilizarea chirurgicală feminină:

- a) Are o eficiență scăzută
- b) Reprezintă eliminarea capacității de reproducere fără a afecta funcția sexuală și endocrină
- c) Este asociată cu o creștere a riscului de cancer ovarian

17. Sarcoamele au o incidență scăzută și apar de obicei la:

- a) Copii
- b) Femeile în vârstă
- c) Adolescente

18. Activitatea de îngrijiri generale de sănătate se exercită cu titlul profesional de:

- a) asistent medical generalist
- b) asistent medico-social
- c) asistent medical

19. La lăuzele cu Rh negativ, care au născut un copil cu Rh pozitiv și care nu sunt izoimunizate:

- a) Se administrează imunoglobulină anti-D în primele 30 de zile după naștere
- b) Nu se administrează imunoglobulină anti-D
- c) Se administrează imunoglobulină anti-D în primele 72 de ore postpartum

- 20. Reatestarea competențelor profesionale de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este necesară:**
- a) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu fac dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 1 an în ultimii 5 ani anterior datei solicitării certificatului de membru și/sau avizului anual
 - b) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali aflați în primii 4 ani de la dobândirea titlului de calificare
 - c) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali aflați în primii 5 ani de la dobândirea titlului de calificare
- 21. În sarcină, progesteronul este secretat:**
- a) La început de corpul galben, apoi de placentă
 - b) De miometru
 - c) De endometru
- 22. La sfârșitul trimestrului II de sarcină se recomandă repetarea unor examene paraclinice precum:**
- a) Colesterol, uree, creatinina, Scor ROMA, grupa sanguină și factorul Rh
 - b) Amniocenteza, urocultura și HLG
 - c) HLG, examenul sumar de urină, examenul secrețiilor vaginale și culturi din col, glicemia și testul de toleranță orală la glucoză
- 23. În cazul incontinenței urinare de efort (IUE) de gradul I, pierderile involuntare de urină apar:**
- a) La eforturi mari, precum tusea și strănutul
 - b) În timpul defecației
 - c) La schimbarea poziției corpului în pat
- 24. În avorturile spontane:**
- a) Durerile pelvi-abdominale au caracter colicativ, sunt intermitente, cu intensitate variabilă
 - b) Sângele eliminat are aspect de zaț de cafea
 - c) Dilatația colului uterin se produce după expulzia produsului de concepție
- 25. Prolapsul genital se caracterizează prin:**
- a) Coborârea pereților vaginali și a uterului în axul vaginului, cu posibilă exteriorizare prin orificiul vulvar
 - b) Inflamația acută a pereților vaginali, însoțită de secreții abundente
 - c) Creșterea în volum a ovarelor și apariția durerii pelvine
- 26. Alimentația lăuzei care nu a născut prin operație de cezariană poate fi reluată:**
- a) Imediat sau la o distanță de 1-3 ore după naștere
 - b) La 8 ore după naștere
 - c) După 12-24 de ore

- 27. Care din următoarele enunțuri cu privire la surorile medicale și oficianții medicali este adevărat:**
- a) sunt membri asociați ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) nu au obligația de a se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) nu sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- 28. Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităților de asistent medical generalist, moașă și asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către:**
- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) Ministerul Sănătății
 - c) Ministerul muncii , familiei, tineretului și solidarității sociale
- 29. Controlul și supravegherea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical se face de către:**
- a) Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) Ministerul Sănătății
 - c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România
- 30. Ce reprezintă infertilitatea unui cuplu:**
- a) Incapacitatea femeii de a rămâne gravidă într-un interval de timp de 1 an
 - b) Incapacitatea femeii de a rămâne gravidă timp de 6 luni, indiferent de numărul actelor sexuale
 - c) Incapacitatea femeii de a rămâne gravidă într-un interval de timp de 5 ani
- 31. Recoltarea secreției vaginale pentru examenul bacteriologic și parazitologic se face:**
- a) Din canalul cervical
 - b) De pe peretele anterior al vaginului
 - c) Din fundul de sac posterior
- 32. Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:**
- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) Ministerul Educației
 - c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în colaborare cu Ministerul Sănătății

33. Despre chisturile ovariene funcționale putem afirma că:

- a) Dimensiunea lor nu depășește 1-2 centimetri
- b) Nu pot fi tratate decât prin metode chirurgicale
- c) Apar la femeile în plină activitate sexuală

34. Incontinența urinară de efort (IUE) se caracterizează prin:

- a) Pierderi de urină, precedate întotdeauna de cefalee
- b) Pierderi urinare care apar exclusiv în timpul somnului
- c) Pierderi involuntare de urină care apar concomitent cu efortul, fără senzația prealabilă de a urina

35. Încetarea neintenționată a sarcinii, fără intervenții deliberate pentru eliminarea embrionului sau a fătului se numește:

- a) Avort terapeutic
- b) Avort spontan
- c) Avort provocat

36. Care factor poate contribui la apariția prolapsului genital:

- a) Traumatismul obstetrical
- b) Infecțiile urinare recurente
- c) Fumatul

37. Diagnosticul de certitudine al sarcinii gemelare se stabilește prin:

- a) Examenul clinic al abdomenului gravidei și mișcările fetale
- b) Testul triplu
- c) Ecografie obstetricală

38. În vulvovaginitele nespecifice, denumite vaginoze, leucoreea este:

- a) Galben-purulentă, asociată cu disurie
- b) Verzuie, fluidă, spumoasă cu miros de migdale
- c) De culoare gri, cenușie, cu miros fetid

39. Hormonul gonadotropină corionică umană (HCG) prezintă valori crescute în:

- a) Tumorile mamare
- b) Tumorile uterine
- c) Sarcină și unele tumori ovariene

40. Care din afirmația următoare nu este adevărată:

- a) Ovarul este un organ unic, situat pe linia mediană
- b) Este principala glandă sexuală a femeii care determină caracterele sexuale primare
- c) Are un rol dublu: produce ovulele și are un rol important de glandă endocrină, prin secreția hormonilor sexuali

41. „Furia laptelui” se caracterizează prin:

- a) Apariția unor noduli la nivelul sânilor, însoțită de lipsa lactației
- b) Hiperlactație, care nu este însoțită de durere în timpul alăptării
- c) Sâni tensionați și foarte dureroși, însoțiți de o ușoară creștere a temperaturii corporale

42. La termen, volumul lichidului amniotic este de aproximativ:

- a) 1200 – 1500 ml
- b) 500 – 800 ml
- c) 200 – 300 ml

43. Sarcina prelungită este definită ca sarcina care depășeste:

- a) 38 de săptămâni
- b) 42 de săptămâni
- c) 28 de săptămâni

44. Hipertensiunea arterială cronică se manifestă:

- a) Înainte de săptămâna 20-a de gestație
- b) Imediat după naștere
- c) După săptămâna 20-a de gestație

45. Principala manifestare clinică în cancerul de endometru este:

- a) Dureri pelvine asociate cu scaune diareice
- b) Hemoragia
- c) Hipermenoreea

46. Pelvimetria internă se realizează prin:

- a) Cu centimetrul
- b) Tact vaginal
- c) Ecografic

47. Printre beneficiile alăptării putem menționa:

- a) Oferă protecție împotriva infecțiilor bacteriene, fungice și virale
- b) Consolidează legătura dintre nou-născut și tată
- c) Favorizează vindecarea afecțiunilor cardiace ale nou-născutului și sugarului

- 48. Asistentul medical generalist și moașa exercită activitățile profesionale cu asumarea responsabilității :**
- a) pentru planificarea, organizarea, evaluarea și furnizarea serviciilor
 - b) numai pentru evaluarea și furnizarea serviciilor
 - c) numai pentru planificarea și organizarea serviciilor furnizate
- 49. Care dintre următoarele metode contraceptive oferă și protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală?**
- a) Prezervativul masculin
 - b) Dispozitivul intrauterin
 - c) Contraceptivele orale combinate
- 50. Mola hidatiformă este caracterizată prin:**
- a) Nivelurile serice scăzute de hCG
 - b) Invazia țesutului molar în peretele uterin și producerea de metastaze la distanță
 - c) Avort spontan în săptămâna 6-8 de sarcină
- 51. În lăuzie, lohiile albe apar:**
- a) În primele 2–3 zile
 - b) După primele două săptămâni, până la sfârșitul lăuziei
 - c) Între ziua a 5-a și ziua a 15-a
- 52. Care dintre următoarele variante conține materialele necesare pentru efectuarea colposcopiei:**
- a) Specul vaginal, seringă sterilă de 10 ml, ser fiziologic și substanță de contrast
 - b) Compresse sterile, cateter urinar, soluție antiseptică și anestezic local
 - c) Specul vaginal, comprese, tampoane sterile, soluție de acid acetic și soluție Lugol
- 53. Înainte recoltarea secrețiilor cervicovaginale pentru examenul citoumoral Babeș-Papanicolaou, se evită raporturile sexuale cu:**
- a) 24 de ore
 - b) 72 de ore
 - c) 12 de ore
- 54. Boala inflamatorie pelvină crește riscul de:**
- a) De apariție a fibromului uterin
 - b) Apariție a cancerului de ovar
 - c) De sarcină ectopică

- 55. Inflamațiile vulvo-vaginale au ca principală manifestare clinică:**
- a) Leucoreea
 - b) Polakiuria
 - c) Sângerarea
- 56. Asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical aflat în stare de incompatibilitate este obligat să anunțe filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România al cărui membru este, în termen de:**
- a) 10 zile de la apariția acesteia
 - b) 48 de ore de la apariția acesteia
 - c) 30 de zile de la apariția acesteia
- 57. Mulsul sânelui este o tehnică nedureroasă care permite extragerea laptelui din sân:**
- a) Doar când acesta este foarte plin și doar în primele zile după naștere
 - b) Manual sau cu pompă de muls
 - c) Doar de către moașe sau asistenți medicali care folosesc pompe de muls profesionale
- 58. Prin excepție de la cerințele cumulative de formare, cetățenie, filiație și rezidență, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat terț pot exercita temporar profesia cu avizul:**
- a) Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) Direcției de Resurse Umane din cadrul Ministerului Sănătății
 - c) Direcției de Sănătate Publică pe teritoriul căreia se află unitatea sanitară în care își vor desfășura activitatea
- 59. Sindromul HELLP se caracterizează prin:**
- a) Hemoliză, creșterea transaminazelor hepatice și trombocitopenie
 - b) Paloare și anemie
 - c) Hipotensiune arterială și leucopenie
- 60. Vulvovaginita candidozică apare frecvent în următoarele situații:**
- a) După terminarea sângerării menstruale
 - b) În urma contactelor sexuale cu parteneri multipli
 - c) După administrarea de antibiotice, corticosteroizi, citostatice sau estroprogestative, precum și în contextul sarcinii și diabetului zaharat
- 61. Placenta la termen:**
- a) Nu are comunicare directă între sistemele circulatorii matern și fetal
 - b) Măsoară aproximativ 10 cm în diametru
 - c) Are o greutate de 100 - 200 g

- 62. Mucoasa canalului cervical este formată din epiteliu cilindric și secretă:**
- a) Insulină
 - b) Gleră cervicală
 - c) FSH
- 63. Ce informații oferă histerosalpingografia în evaluarea infertilității feminine:**
- a) Evaluarea funcției ovariene
 - b) Aspectul și permeabilitatea cavității uterine, trompelor și colului uterin
 - c) Prezența sau absența chisturilor ovariene și a fibroamelor
- 64. Alegerile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară:**
- a) o dată la 5 ani
 - b) o dată la 4 ani
 - c) anual
- 65. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România acordă asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat terț aviz de exercitare temporară a profesiei în scop didactic și ocazional, sau în cadrul acțiunilor umanitare, al situațiilor de urgență, sau în cadrul schimburilor de experiență și al convențiilor încheiate cu statul ței de proveniență al acestora:**
- a) pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an
 - b) pentru o perioadă de 3 luni, fara posibilitatea de prelungire
 - c) pentru o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă 6 luni pe an
- 66. Valorile normale ale BCF (bătăile cordului fetal) sunt:**
- a) Între 140 – 180 bătăi /min
 - b) Între 80 – 120 bătăi /min
 - c) Între 120 – 160 bătăi /min
- 67. Care dintre următoarele reprezintă o metodă naturală de planificare familială:**
- a) Contraceptivul oral combinat
 - b) Dispozitivul intrauterin
 - c) Metoda calendarului
- 68. Infecțiile mamare puerperale sunt caracterizate de simptome precum:**
- a) Creșterea temperaturii locale, edem, eritem al sânului, febră și alterarea stării generale
 - b) Secreție de colostru, necroză locală, febră și frison
 - c) Galactoree și angorjarea sânului

- 69. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:**
- a) Ministerul Educației
 - b) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) Ministerul Sănătății
- 70. În România , profesiile de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical se exercită de către posesorii unui titlu oficial de calificare după caz, în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moașă și, respectiv, de asistent medical care:**
- a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat tert
 - b) sunt cetățeni ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai unui stat terț
 - c) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene
- 71. Principalul semn funcțional al instalării sarcinii este:**
- a) Durerile abdominale
 - b) Greața și vărsătura
 - c) Amenoreea
- 72. Preeclamsia se caracterizează prin:**
- a) Hipertensiune arterială cronică însoțită de poliurie
 - b) Hipertensiune arterială înainte de 20 de săptămâni de sarcină fără proteinurie
 - c) Hipertensiune arterială prelungită după 20 de săptămâni de sarcină, asociată cu proteinurie
- 73. Care este investigația de bază pentru evaluarea factorului masculin în infertilitate:**
- a) Spermograma
 - b) Laparoscopia
 - c) Ecografia testiculară
- 74. Prezența frontală este o prezență distocică, iar punctul de reper este:**
- a) Fontanela mare (bregma)
 - b) Mentonul
 - c) Nasul
- 75. Placenta care acoperă complet orificiul intern al colului uterin se numește:**
- a) Placenta praevia total centrală
 - b) Placenta praevia laterală
 - c) Placenta praevia marginală

- 76. Secreția de prolactină în perioada alăptării este declanșată de:**
- a) Scăderea concentrației de oxitocină
 - b) Supt
 - c) Menstruație
- 77. Care este mecanismul principal de acțiune al contraceptivelor orale combinate (COC):**
- a) Stimularea maturării foliculare
 - b) Inhibarea ovulației prin inhibarea secreției de FSH și LH
 - c) Creșterea secreției de hormoni tiroidieni
- 78. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:**
- a) proceduri de practică pentru asistenți medicali
 - b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei
 - c) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical
- 79. Printre investigațiile paraclinice din cursul sarcinii se numără:**
- a) Ecografia
 - b) Celioscopia
 - c) Colposcopia
- 80. Funcția endocrină a ovarului debutează odată cu:**
- a) Apariția pubertății
 - b) Instalarea menopauzei
 - c) Nașterea primului copil
- 81. Ca modificări tegumentare în sarcină menționăm:**
- a) Hipopigmentația și paloarea pielii
 - b) Icter și purpura
 - c) Apariția cloasmei gravidice și a vergeturilor
- 82. Următoarea prezentație nu permite terminarea nașterii spontan (pe cale vaginală):**
- a) Prezența facială
 - b) Prezența transversală
 - c) Prezența occipitală

- 83. În ce situație se recomandă întreruperea activității sexuale în timpul sarcinii?**
- a) Doar în ultimul trimestru de sarcină, deoarece activitatea sexuală este contraindicată în această perioadă
 - b) În mod obligatoriu, începând cu trimestrul al doilea de sarcină, indiferent de evoluția sarcinii
 - c) În cazul apariției modificărilor colului uterin, precum deschiderea sau scurtarea acestuia, pentru reducerea riscului de naștere prematură și/sau de rupere prematură a membranelor
- 84. Care este principala metodă utilizată pentru diagnosticul de certitudine al cancerului de endometru:**
- a) Citologia cervico-vaginală
 - b) Ecografia transvaginală
 - c) Biopsia de endometru
- 85. Capacitația este procesul de maturare al spermatozoidului care are loc:**
- a) În căile genitale feminine
 - b) În epididim
 - c) În testicul
- 86. Histeroscopia cu biopsie permite:**
- a) Diagnosticul cancerului endometrial doar prin examinarea ecografică a uterului
 - b) Inspectarea directă a cavității uterine și recoltarea de biopsii țintite din leziunile suspecte
 - c) Evaluarea exclusivă a colului uterin, fără posibilitatea recoltării de biopsii
- 87. Care din afirmațiile următoare sunt adevărate:**
- a) Ciclul menstrual debutează o dată cu prima zi a sângerării menstruale și se încheie în preziua sângerării menstruale următoare
 - b) Între zilele 5-7 ale ciclului menstrual are loc ovulația
 - c) Durata medie a ciclului menstrual este de 20 de zile
- 88. Despre colostru putem afirma:**
- a) Are un conținut ridicat de proteine și este bogat în anticorpi
 - b) Inhibă dezvoltarea florei intestinale de tip Bifidus
 - c) Se secretă începând cu a 30-a zi după naștere
- 89. În sarcina monozigotică:**
- a) Cei doi feți pot avea sexe diferite și bagaj genetic diferit
 - b) Este rezultatul fecundării a două ovule distincte
 - c) Cei doi feți au același sex și același bagaj genetic

- 90. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:**
- a) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
 - b) în cazul supunerii la orice fel de intervenție medicală
 - c) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord
- 91. Care dintre următoarele afirmații referitoare la vaccinarea în timpul sarcinii este corectă?**
- a) Vaccinul antitetanic este recomandat de rutină gravidelor nevaccinate
 - b) Vaccinul antirubeolic este recomandat în primele trei luni de sarcină
 - c) Vaccinul antipoliomielitic administrat pe cale orală este obligatoriu în timpul sarcinii
- 92. În aproximativ 90% dintre cazuri, sarcina ectopică are loc:**
- a) Intraligamentar
 - b) Cavitatea abdominală
 - c) Trompele uterine
- 93. Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se eliberează:**
- a) după promovarea reatestării profesionale
 - b) la înscrierea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) anual
- 94. Palparea obstetricală (manevrele Leopold) se realizează:**
- a) În 4 timpi
 - b) În 3 timpi
 - c) În 5 timpi
- 95. Ce informații poate oferi tușeul vaginal la internarea gravidei pentru naștere?**
- a) Greutatea și lungimea fătului
 - b) Lungimea cordonului ombilical și prezentația fetală
 - c) Dilatația colului uterin și starea membranelor
- 96. Factorii care reglează volumul lichidului amniotic sunt:**
- a) Deglutiția și excreția maternă
 - b) Deglutiția și excreția fetală
 - c) Respirația fetală

97. Ruptura uterină se caracterizează prin:

- a) Contractii uterine intermitente, ritmice și nu cresc în intensitate
- b) Fătul nu poate fi palpat
- c) Durere intensă și bruscă

98. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este o organizație profesională:

- a) politică
- b) neguvernamentală
- c) cu responsabilități delegate de Ministerul Educației

99. Chistele de glandă bartholin:

- a) Se realizează prin blocajul ductelor și acumularea fluidului în glandă
- b) Sunt de obicei foarte dureroase
- c) De obicei au o creștere rapidă

100. Care din afirmațiile următoare sunt adevărate:

- a) În țara noastră, pubertatea la fete se derulează între 6 și 9 ani
- b) Determinismul pubertății este de origine hipotalamică prin demararea secreției de GnRH
- c) Menarha apare în jurul vârstei de 8 ani